DLP -3-5-63 216796

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN **TECHNIQUE** DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS **AGRICOLES** 

PUBLICATION MENSUELLE

ÉDITION DE LA STATION RHONE-ALPES

(AIN, ARDECHE, DROME, ISERE, LOIRE, RHONE, SAVOIE, HAUTE-SAVOIE) Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux. 4, place Gensoul - LYON. C. C. P.: LYON 9.430-12

Lisez sur l'enveloppe de ce bulletin le numéro de votre région

Bulletin Nº 32 de Mai 1963

**ABONNEMENT ANNUEL** 

15 NF

7 Mai 1963

page 59

AVERTISSEMENTS

#### VIGNE

**TÉLÉPHONE 37-20-56** 

BLACK-ROT - L'extrême rareté des germes hivernants, du fait de la sécheresse de l'été 1962, permet exceptionnellement de retarder le premier traitement généralisé jusqu'à la date du premier traitement "mildiou".

En revanche, ce premier traitement devra être appliqué dès réception sur les vignes situées en bordure des parcelles abandonnées ou mal entretenues.

#### ARBRES FRUITIERS

TAVELURES - Du fait des pluies fréquentes, de la croissance rapide et de l'apparition probable des taches primaires pendant une assez grande partie du mois, les traitements devront être renouvelés à intervalles de 10 à 12 jours (ou moins en cas de forte pluie).

BACTERIOSE DU NOYER (cacarot) - Un traitement cuprique devra être appliqué dès le début de la chute des chatons.

CARPOCAPSE - L'état actuel des larves et des nymphes laisse présager l'apparition des premiers papillons du 10 au 25 mai dans les régions les plus précoces (basse vallée du Rhône, Bas Bugey, puis moyenne vallée du Rhône, vallée de l'Isère et région lyonnaise). Il est donc encore trop tôt pour traiter. Les dates du premier traitement seront précisées dans des bulletins ultérieurs.

HOPLOCAMPE DU POMMIER - Les conseils du bulletin du 26 avril restent valables dans les régions les plus tardives.

# PETITS FRUITS

ANTHRACNOSE ET DIDYMELLA DU FRAMBOISIER - Poursuivre les traitements fongicides à 10 ou 12 jours d'intervalle.

## INFORMATIONS

### ARBRES FRUITIERS

OIDIUM DU PECHER - Appliquer dès maintenant un premier traitement.

ARAIGNEES ROUGES - Plusieurs espèces sont écloses ou en cours d'éclosion. Il y aura lieu de les surveiller et d'appliquer, le cas échéant, le traitement approprié.

DESSECHEMENT DE BOUQUETS FLORAUX - Sur certaines variétés de poiriers (Mme Ballet, F.Gaillard, Passe-Crassane, Dr. Guyot, William's, principalement) on assiste à un dessèchement massif des bouquets floraux avec noircissement du pédoncule et de quelques feuilles. Ces accidents peuvent avoir diverses causes:

P1358

- physiologiques: gel ou asphyxie des racines, carences, etc. Le feuillage est alors soit rabougri, soit rapidement flétri.
- pathologique: le feuillage reste alors sensiblement normal. Il s'agit alors d'une maladie bactérienne dûe au "Pseudomonas Syringæ", qui serait lui-même favorisé par les carences en bore, assez fréquentes depuis 2 ans.

Dans ce cas plusieurs mesures devraient être prévues en cours d'année:

- addition au prochain traitement de 200gr/hl de pentaborate de soude:
- traitement cuprique de suite après la récolte:
- 1 ou 2 traitements cupriques à la chute des feuilles.

# CONCOURS DE DETECTION DES MALADIES DE LA VIGNE

La Station de Lyon organise un concours de détection des foyers primaires des maladies suivantes de la vigne:

- Mildiou
- Black-rot
- Rougeot pathologique ou brenner

Les envois d'échantillons de feuilles reconnus porteurs de foyers primaires d'une de ces maladies seront récompensés par un abonnement gratuit, au "bulletin technique" et à "Phytoma" pour la durée de l'année 1964, dans les limites suivantes:

- premier échantillon de chaque commune productrice de crus (A.C. A.O. ou V.D.Q.S.)
- 3 premiers échantillons de chaque région naturelle de notre nomenclature, pour toute commune non productrice de crus.

Les concurrents devront indiquer:

- la commune sur laquelle a été recueilli l'échantillon
- le lieu-dit
- le cépage
- la date à laquelle il a été prélevé
- leur adresse exacte.

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux A.PITHIOUD

Le Contrôleur chargé des Avertissements agricoles P.LATARD